



**LINOLEICO (CONVENCIONAL)**


<b>SECANO</b>						<b>REGADÍO</b>					
Casa Comercial	Variedad	Ciclo	Comportamiento			Casa Comercial	Variedad	Ciclo	Comportamiento		
			Peso kg/ha	Grasa %	Grasa kg/ha				Peso kg/ha	Grasa %	Grasa kg/ha
VARIETADES CON DOS AÑOS DE ENSAYO											
AGROPRO	<b>SUREST HTS</b>	medio-corto				AGROPRO	<b>SUREST HTS</b>	medio-corto			
KWS	<b>ARNETES SU</b>	medio				KWS	<b>ARNETES SU</b>	medio			
	<b>SUVEX</b>	medio					<b>SUVEX</b>	medio			
VARIETADES CON TRES O MÁS AÑOS DE ENSAYO											
LIDEA	<b>ARMONICA SU</b>	medio-corto				LIDEA	<b>ARMONICA SU</b>	medio-corto			
	<b>LENA</b>	corto					<b>LENA</b>	corto			
SYNGENTA	<b>SUZUKA HTS</b>	medio-corto				SYNGENTA	<b>SUZUKA HTS</b>	medio-corto			

**ALTO OLEICO**

<b>SECANO</b>						<b>REGADÍO</b>					
Casa Comercial	Variedad	Ciclo	Comportamiento			Casa Comercial	Variedad	Ciclo	Comportamiento		
			Peso kg/ha	Grasa %	Grasa kg/ha				Peso kg/ha	Grasa %	Grasa kg/ha
VARIETADES CON TRES O MÁS AÑOS DE ENSAYO											
AGROPRO	<b>SY SONORA</b>	corto				AGROPRO	<b>SY SONORA</b>	corto			
CSPRO	<b>CHROMATIC</b>	corto				CSPRO	<b>CHROMATIC</b>	corto			
RAGT	<b>RGT HANATOLL</b>	medio				RAGT	<b>RGT HANATOLL</b>	medio			
SYNGENTA	<b>SUBEO HTS</b>	medio				SYNGENTA	<b>SUBEO HTS</b>	medio			



*Sistema ExpressSun*: variedad resistente al Tribenuron-Metil.



El dato relativo al ciclo es orientativo ya que la longitud del ciclo del girasol depende, principalmente de la temperatura y del número de horas de luz al día (fotoperiodo). Por ello el ciclo puede variar dependiendo de la zona y la fecha de siembra.